



Børn
og operation

Denne folder indeholder nogle praktiske oplysninger til jer forældre, når jeres barn skal bedøves og opereres. Folderen er et supplement til folderen "Generel vejledning i forbindelse med din operation", samt folderen om den operation, som Jeres barn skal have foretaget. Vi opfordrer Jer til at læse materialet igennem.

Hvor meget skal I fortælle barnet?

I skal tale med barnet om forløbet i det omfang, I finder relevant. Det afhænger først og fremmest af barnets alder, modenhed og erfaringer fra tidligere. Det er vigtigt at være ærlig overfor barnet, uden dog at fokusere for meget på de ting, som barnet måske kan finde skræmmende. Som forældre skal I også være opmærksomme på, ikke at overføre jeres eventuelle nervøsitet til barnet.

Det er en stor hjælp, hvis barnet er forberedt. Derfor er det en god idé at downloade vores malebog på hjemmesiden, som beskriver forløbet før, under og efter operationen. Hvis barnets alder tillader det, opfordrer vi jer til at læse den med barnet, så det er fortrolig med, hvad der skal ske på operationsdagen. Barnet kan også male lidt i den, når I kommer ind på Aleris.

Vi opfordrer til, at mindst én af jer forældre deltager så meget som muligt. Det giver jeres barn tryghed, at I hele tiden er der. Derimod er det ikke hensigtsmæssigt, at søskende og andre familiemedlemmer tager med på hospitalet.

I skal forberede jer på, at det, for jer som forældre, kan være en svær oplevelse, at se sit barn blive bedøvet. Det er dog vigtigt for barnet, at en af jer er til stede. Det gælder også, når barnet vågner op efter bedøvelsen. Her kan barnet godt være lidt uroligt og have brug for far eller mor.

Tryllecreme / trylleplaster

Barnet bliver evt. bedøvet via et drop i hånden. Det er derfor en god ide at købe tryllecreme eller trylleplaster på apoteket. Det er en lokalbedøvende creme / plaster, der skal smøres /

påsættes på hånddryggen, inden I tager hjemmefra på operationsdagen. Følg vejledningen i pakken. Dermed kan anæstesi-lægen / anæstesi-sygeplejersken lægge droppet helt eller næsten helt smertefrit.

På operationsstuen

Én af jer forældre må gerne følge med på operationsstuen og holde i hånd, mens barnet bliver bedøvet (bamse må også gerne følge med).

På operationsstuen bliver barnet flyttet over på operationslejet. Her får barnet fastklæbet 3 elektroder på brystet til overvågning af hjerterytmen. En blodtryksmanchet sættes om armen og en iltmåler på fingeren.

Bedøvelse af barnet

Bedøvelsen gives enten via drop eller via maske:

- Via drop betyder, at bedøvelsen gives i en blodåre på barnets hånd igennem et tyndt plastikrør, kaldet en venflon. Anlæggelse af venflon kan gøres næsten helt smertefrit, når barnet har haft tryllecreme / trylleplaster på. Efter at venflon / droppet er lagt, indsprøjtes bedøvelsesmidlet via droppet, og barnet sover i løbet af få sekunder. Droppet bruges også til at give barnet saltvand og medicin under operationen.

- Via maske betyder, at bedøvelsen gives ved, at en maske holdes over barnets næse og mund. Derved inhalerer barnet bedøvestoffet, og barnet sover i løbet af 1 - 2 minutter.

Når barnet er faldet i søvn, forlader du operationsstuen og venter på sengestuen eller i venteværelset, mens operationen foregår.

Bedøvelsen vedligeholdes under hele operationen, hvor barnet overvåges tæt af anæstesipersonalet. Når operationen er overstået, afsluttes bedøvelsen, og barnet vækkes på operationsstuen. Barnet køres nu på opvågningsstuen, hvor det gradvis kommer til sig selv. Barnet vågner først rigtig op på opvågningsstuen.

I får besked, så snart operationen er overstået, så I kan være hos barnet, mens det vågner og kommer til sig selv.

Hvordan har barnet det efter operationen?

De fleste børn kommer sig hurtigt efter bedøvelsen. Pga. bedøvelsen og den smertestillende medicin kan barnet godt være døsig de første timer. Det er ikke ualmindeligt, at barnet sover den første time på opvågningen. I skal ikke være nervøse, hvis barnet er lidt uroligt og græder, når det vågner op efter bedøvelsen.

Vi vil gerne understrege, at det er en fordel, at I ikke vækker barnet, men lader det vågne af sig selv. Får barnet lov at vågne af sig selv, vil det være mere veltilpas og rolig. Vi forventer, at en af jer er på opvågningen hele tiden, også mens barnet sover.

Efter en operation er det meget forskelligt, hvor meget mad og drikke barnet har lyst til. Som forældre skal I være opmærksomme på, om barnet får nok at drikke i dagene efter operationen. Dette kan I se, ved at vurdere barnets urin, der skal være lys gul og klar. Er urinen mørk, er det ofte tegn på væskeunderskud.

Indtagelse af mad kan, især efter operation i halsen, være lidt svært det første døgn tid. Det kan være lettere for barnet at drikke end spise. I så fald lad barnet drikke næringsrige drikke, fx kakaomælk eller spise is.

I langt de fleste tilfælde kan barnet komme hjem allerede få timer efter operationen og være i fuldt vigør igen i løbet af få dage.

Er der restriktioner?

Oftest er der ingen begrænsninger på, hvad barnet må efterfølgende, men det vil fremgå af folderen omkring operationen.

Inden udskrivelsen taler I med speciallægen og sygeplejersken om planen og evt. forholdsregler i tiden efter operationen.

Aleris Hospitaler - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

www.aleris.dk

Telefon åbningstider i kundeservice

	Vest	Øst
Mandag - torsdag	8 - 18	8 - 18
Fredag	8 - 15	8 - 16
Lørdag - søndag	Lukket	Lukket