



Ørespytkirtel

De sygdomme, der kan føre til operation af ørespytkirtlerne er især knuder. Disse er dog heldigvis oftest godartede. De kommer gradvist men kan blive voldsomt store, hvis de ikke bliver fjernet.

Mundhulen er beklædt med en slimhinde, der holdes fugtig af spyt. Spytet kommer fra tre par spytkirtler. Et par ligger under tungen, et par under kæben, og det sidste par, som kaldes ørespytkirtlerne, ligger foran øret. Det er hævelse af ørespytkirtlerne, der fx giver fåresyge.

Ørespytkirtlen sørger især for spytproduktion, når du spiser. Da du har flere spytkirtler, kan du godt undvære ørespytkirtlen. Kirtlerne under kæben producerer hele tiden spyt. Det er årsagen til, at tandlægen må anvende en spysuger under tungen, mens han arbejder.

Behandling af ørespytkirtlen

Operation af ørespytkirtlen er en specialistopgave pga. de mange nerver, der ligger omkring ørespytkirtlen. I forbindelse med operation af ørespytkirtlen skal man især passe på ansigtsnerven.

Forundersøgelse

Inden beslutningen om en operation kommer du til forundersøgelse hos en af vores speciallæger i øre-næse-halskirurgi.


Speciallægen lytter til dine symptomer og undersøger kinden og halsen. I enkelte tilfælde kan der være behov for at lave en ultralydsscanning.

Aftaler I, at en operation er nødvendig, gennemgår speciallægen forløbet samt mulige bivirkninger og komplikationer med dig. I taler desuden om, hvad du kan forvente dig af operationen.

Datoen for operationen kan du selv være med til at bestemme, så den passer ind i din kalender.

Forventninger

Du skal forvente, at kinden er hævet i den første tid efter operationen. Der vil være nedsat følesans over kinden og ved øreflippen. Der kan gå 2 - 3 måneder, inden følesansen er normal igen.



Spytkirtlernes placering

Forberedelse

Vi anbefaler, at du inden operationen har læst denne folder samt folderen "Generel vejledning i forbindelse med din operation".

Faste

Operationen foregår i fuld bedøvelse, og du skal derfor møde fastende til operationen.

Pause med medicin

Se angående dette i folderen "Generel vejledning i forbindelse med din operation" eller "Vanlig medicin i forbindelse med din operation".

Fjernelse af skæg og hår

Hvis du har skæg eller hår i det område, hvor du skal opereres, bedes du selv fjerne det om morgenen på operationsdagen. Det skal du gøre for at huden kan blive desinficeret og vi kan sætte plaster på såret.

Indlæggelse

Du må forvente at være indlagt natten over. Udskrivelsen sker efter morgenmaden.

Operation


Operationen varer ca. 2 - 3 timer.

Du bliver bedøvet ved, at der lægges en kanyle ind i håndryggen, hvor bedøvelsesmidlet sprøjtes ind.

Speciallægen lægger et snit foran øret og ned under underkæben. Snittet lægges i en naturlig fold på halsen. Det betyder, at arrene meget hurtigt bliver usynlige.

Efter at ansigtsnerven er frilagt og i sikker afstand fra knuden, fjernes knuden med det omgivende ørespytkirtelvæv. Under operationen anvendes der et specielt apparat (Neuro-sign), som registrerer, om speciallægen er tæt på ansigtsnerven. Dermed minimeres risikoen for at beskadige ansigtsnerven.

Ved operationens afslutning lægger speciallægen et sugedræn, som er en



tynd plastikslange syet fast til huden nær operationsstedet. Dette sker for at fjerne overskydende blod og vævsvæske fra operationssåret.

Derudover får du et plaster henover stingene. Det fjernede væv sendes til nærmere undersøgelse.

Efter operationen

Efter operationen taler du med speciallægen og sygeplejersken, som informerer om planen og forholdsregler i tiden efter operationen.

Smerter

Du kan have lette smerter efter operationen. Du kan få smertestillende medicin, hvis du har behov for det.

Dræn

Drænet bliver fjernet næste morgen, inden du skal hjem.

Efter udskrivelsen

Smerter

Du kan evt. have behov for smertestillende håndkøbsmedicin.

Mad og drikke

For at undgå at stimulere spytproduktionen for meget, skal du undgå stærkt krydret mad de første 2 uger efter operationen.

Sår / plaster

Plasteret må du fjerne 24 timer efter operationen, og du skal kun have plaster på igen, hvis det væsker fra såret. Steristrips hen over såret skal blive siddende, indtil du kommer til ambulante opfølgning.

Bad

1 døgn efter, at drænet er fjernet, må du tage brusebad.

Hævelse og misfarvning

Operationsområdet bliver oftest hævet og misfarvet i den første uge til to. Det forsvinder af sig selv.

Daglige gøremål

Almindelig daglig aktivitet og gøremål kan du genoptage stille og roligt, som du formår.

Sport og motion bør du vente med til efter den ambulante opfølgning.

Arbejde og sygemelding

Du skal regne med at være sygemeldt 7 - 10 dage og evt. længere, hvis dit arbejde er fysisk krævende. Du aftaler med speciallægen, hvad du skal regne med i din situation.

Fjernelse af tråde og opfølgning

En uge efter operationen kommer du til ambulante opfølgning, hvor trådene bliver fjernet. Her får du også svar på undersøgelsen af spytktirtlen.

Mulige bivirkninger og komplikationer

Blodansamling og infektion

Der kan opstå blodansamling og betændelse i såret. Hvis du får feber eller voldsom hævelse, kan det være tegn på betændelse eller blodansamling. I så fald skal du kontakte os.

Føleforstyrrelse til det ydre øre

Følenerven til det ydre øre sender en sidegren ind i spytktirtlen. Denne kan påvirkes ved operationen, og det kan medføre en forbigående føleforstyrrelse til det ydre øre, som varer op til 10 uger. I sjældne tilfælde er føleforstyrrelsen til det ydre øre permanent.

Nedsættelse af ansigtsmimikken

Selv om ansigtsnerven næsten altid bevares intakt, kan det være nødvendigt at skubbe til grenene under vejs. Derfor vil ca. 10 - 15%, af dem, som bliver opereret, have en forbigående nedsættelse af ansigtsmimikken. Det er næsten altid mundvigen, det går ud over. Det kan vare fra nogle få dage til 4 - 5 uger, hvilket dog er sjældent. For at mindske risikoen for skade på ansigtsnerven, bliver den under operationen overvåget vha. elektroder i panden og mundvigen.

Freys-syndrom

Et særligt fænomen er det såkaldte Freys-syndrom, hvor endegrenene af de små nerver, der stimulerer

spytktlerne, vokser ind i hudens svedkirtler på halsen. Det betyder, at du kan blive fugtig på halsen, når du bliver rigtig lækkersulten. Tilstanden ophører sædvanligvis af sig selv efter nogle måneder, og mange opdager det slet ikke. Man kan dog måle, at op mod halvdelen af de opererede har fænomenet i større eller mindre grad.

Egne notater

Aleris Hospitaler - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

www.aleris.dk

Telefon åbningstider i kundeservice

	Vest	Øst
Mandag - torsdag	8 - 18	8 - 18
Fredag	8 - 15	8 - 16
Lørdag - søndag	Lukket	Lukket

KELB 40