



# Væske i mellemøret

## Dræn

Rigtigt mange forældre har oplevet, at deres børn får ørepine. Det kan skyldes forskellige sygdomme i øret. Den hyppigste årsag er det, man kalder mellemørekatarr, hvor der i forbindelse med en forkølelse opstår en aflukning af det eustatiske rør, som forbinder næsesvælget med mellemøret.

Aflukningen medfører, at der hurtigt udvikler sig et undertryk i mellemøret, som giver øresmerter. Man ser også en gang imellem det samme hos voksne. Nogen gange provokeres tilstanden af, at man ikke får trykkudligning i forbindelse med en flytning.

Når der har været undertryk i mellemøret nogle få timer, danner der sig væske i mellemøret. Væsken er i begyndelsen tyndtflydende, men bliver senere mere slimet, næsten som en klat halvstørket lim, hvorfor englænderne også kalder tilstanden for "glue ear".

Når luften i mellemøret erstattes af væske eller slim, får børnene nedsat hørelse og i begyndelsen tilbagevendende ørepine. For mange børn påvirker hørenedsættelsen sprogudviklingen og kan give anledning til en ændret adfærd, der skyldes frustration over den tabte kontakt med omverdenen.


## Behandling

Væske i mellemøret behandles ved at suge væsken ud gennem et lille snit i trommehinden. Er der tale om et "glue ear", indsætter speciallægen samtidig et dræn i trommehinden for at sikre en trykneutralisering af mellemøret. Samtidig letter drænet muligheden for, at sekretet kan passere ud gennem det eustatiske rør. Hos børn kræver indsættelse af drænet en kortvarig bedøvelse, mens det hos voksne kan klares i lokalbedøvelse.


## Forundersøgelse

Du / I kommer først til en forundersøgelse, hvor speciallægen i øre-næse-halskirurgi lytter til de gener, som du / barnet har. Ørerne undersøges, og der foretages en høreprøve med måling af mellemøretrykket.

Er der behov for behandling med indlæggelse af et dræn, bliver der hos voksne ofte lagt dræn med det samme i lokalbedøvelse.



## Ørets anatomi



## Forstørrelse af mellemøret

Er det et barn, som skal have dræn, gennemgår speciallægen forløbet samt mulige bivirkninger og komplikationer med jer. I taler desuden om, hvad I kan forvente af operationen.

Datoen for operationen kan I selv være med til at bestemme, så den passer ind i jeres kalender.

## Forventninger

Du / I kan forvente, at anlæggelse af dræn medfører en umiddelbar normalisering af hørelsen.

### Fjernelse af drænet?

Drænet falder ud af sig selv efter 1/2 - 1 år (en gang i mellem efter endnu længere tid). Drænet ligger så i en lille klat ørevoks inde i øregangen og gør ingen skade. Det kommer således ud af sig selv.

Hvis der igen kommer problemer med øret, kan det blive nødvendigt med et nyt dræn.

## Forberedelse

Hvis indgrebet foregår i lokalbedøvelse i forbindelse med forundersøgelsen, er der ingen forberedelser.

Ellers anbefaler vi, at du / I inden operationen har læst denne folder samt folderen "Generel vejledning i forbindelse med din operation".

Hvis dit barn skal opereres, skal du som forældre også læse folderen "Børn og operation".

### Faste

Operationen foregår i fuld bedøvelse, og barnet skal derfor møde fastende til operationen.

### Pause med medicin

Se angående dette i folderen "Generel vejledning i forbindelse med din operation" eller "Vanlig medicin i forbindelse med din operation".

## Dagkirurgi (ambulant)

Anlæggelse af dræn bliver lavet som dagkirurgi, og I kan forvente at blive udskrevet få timer senere samme dag.

## Operation

Da anlæggelse af dræn er kortvarigt, bliver barnet bedøvet vha. en maske. Når drænene er lagt, afsluttes bedøvelsen, og barnet vækkes.

## Efter operationen

Efter anlæggelse af dræn taler du / I med speciallægen og sygeplejersken, som informerer om planen og forholdsregler i tiden efter operationen.

## Efter udskrivelsen

### Smerter

Normalt vil der ikke være særlige smerter, men i givet fald kan det klares med smertestillende håndkøbsmedicin.

## **Restriktioner**

Efter operationen er der ingen andre restriktioner, end at du / barnet ikke må dykke mere end max. ½ meter ned. Ved dykning længere ned, kan der trænge vand ind gennem drænet.

## **Ambulant opfølgning**

Efter 2 - 3 måneder kommer du / I ind til tjek af drænets funktion enten hos os eller hos egen ørelæge.

## **Mulige bivirkninger og komplikationer**

Der er en lille risiko for, at der kan komme infektion i øret, når der er dræn i trommehinden. Det viser sig ved, at der kommer udflåd fra øregangen. Hvis drænet fungerer godt, kommer der ingen smerter. Infektionen vil i de fleste tilfælde kunne behandles med øredråber. Det er undtagelsen, at det er nødvendigt at fjerne drænet pga. infektion.

# Egne notater

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Aleris Hospitaler - Vest

---

### Aalborg

Sofiendalsvej 97  
DK - 9200 Aalborg SV  
Tlf. +45 3637 2750  
aalborg@aleris.dk

### Esbjerg

Bavnehøjvej 2  
DK - 6700 Esbjerg  
Tlf. +45 3637 2700  
esbjerg@aleris.dk

### Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal  
DK - 8200 Aarhus N  
Tlf. +45 3637 2500  
aarhus@aleris.dk

### Herning

Poulsgade 8, 2. sal  
DK - 7400 Herning  
Tlf. +45 3637 2600  
herning@aleris.dk

## Aleris Hospitaler - Øst

---

### København

Gyngemose Parkvej 66  
DK - 2860 Søborg  
Tlf. +45 3817 0700  
kobenhavn@aleris.dk

### Ringsted

Haslevvej 13  
DK - 4100 Ringsted  
Tlf. +45 5761 0914  
ringsted@aleris.dk

[www.aleris.dk](http://www.aleris.dk)

## Telefon åbningstider i kundeservice

	Vest	Øst
Mandag - torsdag	8 - 18	8 - 18
Fredag	8 - 15	8 - 16
Lørdag - søndag	Lukket	Lukket

KDHC 20